

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

برونشیت

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص

برونشیت طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

❖ رژیم غذایی

- ✓ در صورت تنفس مشکل، تغذیه از راه دهان (موقتاً تا بهبود علائم) ، قطع و جایگزین آن مایعات وریدی داده می شود.
- ✓ پس از شروع رژیم توسط پزشک به کودک اجازه دهید که رژیم غذایی در حد تحمل و مورد علاقه خود را داشته باشد.
- ✓ مرتباً به کودک نوشیدنی‌های صاف مثل آب، چای، لیموناد، سوپ‌گوشت رقیق شده، آبمیوه یا ژلاتین رقیق شده بدهید.

❖ فعالیت

- ✓ کودک را تا 48 ساعت پس از رفع علائم وادار به استراحت کنید. پس از آن کودک می‌تواند تدریجاً فعالیت‌های عادی خود را از سرگیرد.

❖ مراقبت

- ✓ در مرحله حاد بیماری نیاز به اکسیژن تراپی یا مایعات داخل وریدی ضروری است.
- ✓ جهت تخفیف درد سینه می‌توان از یک بالش تک ساده یا کمپرس گرم بر روی قفسه سینه استفاده کنید.
- ✓ رادیوگرافی قفسه سینه، کشت بینی، گلو و آزمایش خون گرفته خواهد شد.
- ✓ از دستگاه بخور جهت تسهیل در تنفس استفاده می‌شود.
- ✓ محیطی آرام برای کودک فراهم آوردید.
- ✓ اگر کودک سرفه مداوم دارد، حتی اگر مدت زمان آن کوتاه است، به پرستار اطلاع دهید.

❖ داروها

- ✓ آنتی بیوتیک جهت جلوگیری از عفونت و گشاد کننده نایژه نیز ممکن است کمک کننده باشد ، طبق دستور پزشک در فواصل و زمان معین توسط پرستار تجویز می‌شود.
- ✓ به کودکی که برونشیت دارد، داروی ضدسرفه داده نمی‌شود. داروهای ضد سرفه برای کودکی که مشکل تنفسی دارد، می‌توانند مضر باشند.

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

برونشیت

❖ رژیم غذایی

- ✓ کودکی که تنفس سریع دارد، ممکن است آب بدنش کم شود. چون بخار آب زیادی از راه تنفس دفع می‌شود. کم آبی در کودکان می‌تواند خطرناک باشد. به کودک از راه دهان، مایعات اضافی بدهید.
- ✓ در طول مدت بیماری و بعد از آن با زیاد کردن تعداد وعده های غذایی از عقب ماندن رشد کودک جلوگیری کنید. بهتراست از غذاهایی مانند سوپ، آش، فرنی و... که احتیاج به جویدن ندارد استفاده کنید.
- ✓ در طول درمان و تا حصول بهبودی کامل از دادن مواد غذایی همچون موز، شیرینی و شکلات، آجیل و دانه های روغنی که باعث تحریک سرفه و افزایش درد قفسه سینه می‌شوند خودداری کنید.
- ✓ از مصرف غذاهای سرخ کرده، پر ادویه و محرک برای کودک خودداری کنید.

❖ فعالیت

- ✓ فعالیت از طریق برنامه ریزی به طوری که با استراحت کودک تداخل ننماید و انجام فعالیت های متناسب با سطح تحمل و سن کودک باشد.

❖ مراقبت

- ✓ از دستگاه بخور جهت افزایش رطوبت اتاق کودک استفاده کنید.
- ✓ در مورد کودک مستعد به برونشیت، هر شب از دستگاه بخور به هنگام عفونت تنفسی و پس از آن استفاده نمایید.
- ✓ دستگاه بخور را روزانه تمیز کنید.
- ✓ اگر دستگاه بخور ندارید، آب سرد و گرم را در حمام باز کنید و پنجره ها و درها را ببندید تا به این ترتیب رطوبت مورد نیاز فراهم شود و کودک در این اتاق، به خصوص قبل از خواب، نگاه دارید.
- ✓ دقت کنید که کودک در چه شرایطی مستعد بروز برونشیت است. مثلاً اگر بازی در هوای خنک شب هنگام باعث حمله کودک می‌شود، از آن اجتناب کنید.
- ✓ مواجهه کودک با جمع راه، به خصوص جمع بچه‌های دیگر کمتر کنید، تا به این ترتیب احتمال سرماخوردگی و بروز برونشیت کمتر شود.
- ✓ بهداشت فردی مانند شست و شوی مرتب دست و صورت را رعایت کنید.
- ✓ از تماس با افراد مبتلا به عفونت های تنفسی اجتناب کنید که بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری تنفسی است.
- ✓ سعی نکنید که خودتان برونشیت را درمان کنید. تشخیص و درمان باید توسط پزشک انجام گیرد.

❖ دارو

- ✓ آنتی بیوتیک ها برای مبارزه با عفونت باکتریایی ثانویه استفاده می‌شوند و داروهای ضد ویروس ممکن است در موارد شدید کمک کننده باشند و داروهای گشاد کننده نایژه نیز ممکن است کمک کننده باشد.
- ✓ داروها طبق دستور پزشک در فواصل منظم و دوره کامل مصرف کنید.
- ✓ به کودکی که برونشیت دارد، داروی ضد سرفه ندهید. داروهای ضدسرفه برای کودکی که اشکال تنفسی دارد، می‌توانند مضر باشند.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ اگر کودک سرفه مداوم دارد، حتی اگر مدت زمان آن کوتاه است، به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ اگر علائم، علی‌رغم درمان در عرض 4 ساعت رو به بهبودی نگذاشت سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.
- ✓ اگر درجه حرارت (مقعدی) تا 38/3 درجه سانتیگراد یا بالاتر افزایش یابد و تنفس مشکل تر شده و اگر سرفه‌ای آغاز شود که با خلط‌خونی همراه باشد و اگر پوست، لبها، ناخن‌ها به رنگ آبی تیره درآیند و یا اگر کودک بی‌حال و خواب‌آلوده شود و در شب با خس‌خس سینه یا تنگی نفس برمی‌خیزد، با اورژانس تماس گرفته یا به پزشک مراجعه نمایید.