

عمل کورتاژ تشخیصی

یکی از روش های رایج برای کنترل خونریزی های غیرطبیعی رحمی و به دست آوردن نمونه کافی از آندومتر جهت بررسی های پاتولوژیک است.

موارد انجام دادن کورتاژ تشخیصی

۱. خونریزی های غیرعادی مخصوصا وقتی به درمان های دارویی پاسخ نمی دهد.
۲. خونریزی رحمی پس از یائسگی
۳. پولیپ های آندومتر
۴. تومور بدخیم و خوش خیم رحمی

آموزش های قبل از عمل :

۸ تا ۱۰ ساعت قبل از عمل چیزی نخورید در صورت اورژانسی بودن عمل به محض اطلاع از خوردن و آشامیدن پرهیزید

- در صورتی که عمل شما خیلی اورژانسی نیست قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال عفونت استحمام کنید و الزام است مو های ناحیه عمل قبل از جراحی تراشیده شود.

- قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآلات، اجسام فلزی، گیره ی سر، دندان مصنوعی و را خارج کنید.

- با الکل ناخن ها و آرایش خود را پاک کنید.

- قبل از خروج از بخش جراحی ادرار خود را تخلیه کنید.

آموزش بعد از عمل:

در حین انجام عمل مختصری بیهوشی عمومی به شما داده می شود. نمونه ای که از شما گرفته شده به واحد پاتولوژی ارسال می شود و رسید آن را تحویل شما می دهند. بعد از عمل ممکن است حالت تهوع داشته باشید که به علت داروهای بیهوشی می باشد. معمولاً عصر روز عمل مرخص می شوید.

توصیه های پس از ترخیص

۱. آنتی بیوتیک و داروهای تجویز شده را به طور کامل و به موقع استفاده کنید.

۲. در روز عمل از فعالیت های سنگین پرهیزید و پس از آن فعالیت عادی داشته باشید.

۳. از شناکردن، حمام کردن داخل وان و نزدیکی به مدت ۱۰ الی ۱۴ روز پرهیز کنید.

۴. یک روش مطمئن برای جلوگیری از بارداری داشته باشید.

۵. اگر میزان خونریزی شما در حد لکه بینی باشد طبیعی است ولی اگر از زمان پریودی شما بیشتر باشد و یا مدت آن طولانی شود حتماً به پزشک مراجعه کنید.

۶. بهداشت فردی خود را رعایت کنید. از لباس زیر نخی استفاده کنید. و روزانه لباس زیر خود را تعویض نمایید.



پیشگاه آموزش و بهداشت بهائیه در استان تهران

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی

امیرالمومنین (ع)

آموزش به بیمار

مراقبت های پس
از کورتاژ تشخیصی

تایید کننده: دکتر اعرابیان

(متخصص زنان و زایمان)

ATF 281/2/03.03



آدرس سایت بیمارستان:

<https://amirhos.semums.ac.ir>

در صورت مشاهده علایم زیر
الزام است به پزشک مراجعه

نمایید:

- تب

- ترشحات زیاد در قسمت زیر شکم

- درد زیاد در قسمت زیر شکم

- افزایش خونریزی

- ترشحات بدبو

- هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، تب،

ضعف، بی حالی و

- توجه داشته باشید عمل کورتاژ هیچ

تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می

توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ

مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید

منبع: طب زنان در عمل تلیندز ۲۰۱۵ ترجمه

دکتر میترا احمد سلطانی

۷. وجود درد در زیر شکم یا ترشحات چرکی
یا خون آبه ای بد بو و تب نشانه عفونت می
باشد لطفاً سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

۸. دوتا سه هفته بعد جواب پاتولوژی که
رسید آن به شما داده شده را از بیمارستان
کوثر دریافت کرده و به مطب پزشک خود
مراجعه نمایید.

۹. تا قطع خونریزی از مقاربت اجتناب کنید

