



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سمنان

واحد آموزش و ارتقاء سلامت

کورتاژ تشخیصی



چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟

– تب

– ترشحات زیاد و بدبو واژن

– درد زیاد در قسمت زیر شکم

– افزایش خونریزی (بیشتر از یک نوار در ساعت)

– ناتوانی در ادرار کردن

– هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، تب، ضعف، بی حالی

و

عمل کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت بدون مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.



خونریزی



درد و گرفتگی



عفونت



آسیب به رحم



چسبندگی داخل رحم



سقط جنین



تاخیر در قاعدگی

منابع:

کتاب طب زنان در عمل تلیندز ۲۰۲۴. ترجمه دکتر اشرف آل یاسین

جهت رویت پمفلت های بیشتر به سایت بیم ارست ان

امیرالمومنین مراجعه کنید.

<https://amirhos.semums.ac.ir>

کد پمفلت: ATF 281/4/05.05

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵

تایید کننده علمی: خانم دکتر ساهره اعرابیان



کورتاژ تشخیصی:

زمانی که شما خونریزی غیرطبیعی رحمی داشته باشید برای نمونه برداری از بافت رحم و تشخیص قطعی علت بیماری این جراحی انجام می شود.

آموزش های قبل از عمل :

شب قبل از جراحی غذای سبک میل کنید. ۶ ساعت قبل از عمل چیزی نخورید. در صورت اورژانسی بودن عمل به محض اطلاع از خوردن و آشامیدن پرهیزید.

داروهایی که در منزل مصرف می کردید ، به طور دقیق قبل از جراحی به پزشک و پرستار اعلام کنید. بهتر است قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال عفونت استحمام کنید و الزام است موهای ناحیه عمل قبل از جراحی تراشیده شود.

قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآلات ، اجسام فلزی ، گیره ی سر ، دندان مصنوعی و را خارج کنید.

لاک ناخن ها و آرایش خود را پاک کنید.


قبل از خروج از بخش جراحی، ادرار خود را تخلیه کنید.

آموزش بعد از عمل:

در حین انجام عمل مختصری بیهوشی به شما داده می شود.

نمونه ای که از رحم شما گرفته شده به آزمایشگاه ارسال می شود و جواب آنرا باید پیگیری کنید و برای ادامه درمان به پزشک خود نشان دهید.

بعد از عمل ممکن است حالت تهوع داشته باشید که به علت داروهای بیهوشی می باشد.



مراقبت ها در منزل:

آنتی بیوتیک و داروهای تجویز شده را به طور کامل و به موقع استفاده کنید.

تا ۱۰ روز بعد عمل از فعالیت های سنگین نداشته و پس از آن فعالیت عادی داشته باشید.

از شناکردن و نزدیکی جنسی به مدت **۱۰ تا ۱۴** روز پرهیز کنید.

اگر میزان خونریزی شما در حد لکه بینی باشد طبیعی است ولی اگر از زمان پیروبی شما بیشتر باشد و یا مدت آن طولانی شود حتما به پزشک مراجعه کنید.

بهداشت فردی خود را رعایت کنید. از لباس زیر نخی استفاده کنید. و روزانه لباس زیر خود را تعویض نمایید.

از نوار بهداشتی به جای تامپون تا ۱۰ روز استفاده کنید.

