



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سمنان
واحد کنترل عفونت و آموزش و ارتقاء سلامت

تب دانگی



کد پمفلت: ATF347/01/05.05

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵

تایید کننده علمی: آقای دکتر مرتضی رضایی

مراقبت از مبتلایان به تب دانگی در منزل امکان پذیر است؟

توصیه های مراقبتی در منزل

- استراحت کافی و مداوم در منزل
- نوشیدن مایعات کافی (شیر، آب میوه، ORS و لعاب برنج)
- نگه داشتن دمای بدن زیر ۳۹ درجه
- مصرف استامینوفن
- پاشویه و دوش با آب ولرم

علائم هشدار دهنده

- حالت تهوع و استفراغ خون
- وجود خون در ادرار
- مشکل خونریزی بینی یا خونریزی لثه
- دشواری در تنفس
- کم آبی بدن
- کاهش پلاکت خون



ISNA

آب راکد یکی از مهم ترین بخش هایی است که به تولید مثل بیشتر پشه ها کمک می کند، در نتیجه برای کاهش خطر تولید پشه در آب راکد می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

آب اضافی را از صفحات زیر گلدان خارج کنید. سطل های آبیاری را برگردانید و آن ها را در زیر سقف نگهداری کنید تا آب نتواند در آن ها جمع شود. خاک گیاهان را طوری در گلدان قرار دهید تا از تشکیل گودال ها در سطح جلوگیری شود. آب گلدان ها را هر روز عوض کنید و داخل آن ها را بشویید.

هنگام پیک نیک و برپایی چادر، منطقه ای را انتخاب کنید که از آب راکد دور باشد.

اگر به مناطق آلوده سفر کردید یا کسی در خانه شما به تب دانگی مبتلا شده، برای پیشگیری؛ مراقب نیش زدن پشه ها باشید.

منابع:

دستورالعمل کشوری معاونت درمان در کنترل بیماری تب دانگی

جهت رویت پمفلت های بیشتر به سایت بیمارستان امیرالمومنین مراجعه کنید.

<https://amirhos.semums.ac.ir>

اعتقاد بر این است که افراد با سیستم ایمنی ضعیف و افرادی که برای بار دوم مبتلا می‌شوند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به تب خونریزی دهنده دانگ هستند.

راههای پیشگیری از تب دانگی

بهترین راه پیشگیری از بیماری دانگ، **جلوگیری از گزش توسما**

پشه‌های آلوده است. به‌ویژه اگر در منطقه گرمسیری زندگی می‌کنید یا به آن‌جا سفر کرده‌اید، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. پیشگیری از گزش پشه‌ها و کنترل جمعیت آن‌ها، روش اصلی جلوگیری از شیوع تب دانگی است.

حتما از تهویه مطبوع استفاده کنید.


حتی در داخل منزل هم از مواد دافع پشه استفاده کنید.

هنگام بیرون بودن از پیراهن‌های آستین بلند و شلوارهای بلند که در جوراب‌ها فرو رفته‌اند، استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که توری پنجره و درب بدون سوراخ هستند. اگر تهویه هوای مناسبی وجود ندارد، حتما از پشه بند استفاده کنید.

برای کاهش جمعیت پشه‌ها، باید مکان‌هایی که در آن پشه‌ها تولید مثل می‌کنند را از بین ببرید. این‌ها شامل لاستیک‌های قدیمی، قوطی یا گلدان‌هایی هستند که باران را جمع می‌کنند. آب حمام پرندگان و ظروف آب حیوانات خانگی را به طور منظم عوض کنید. پرده‌های درب و پنجره را طوری قرار دهید که از ورود پشه‌ها به داخل جلوگیری کنند.

اگر پشه در منطقه شما زیاد است حتما از پشه بند استفاده کنید



علائم تب دانگی شدید

فرد مبتلا به تب خونریزی دهنده دانگ ممکن است موارد زیر را تجربه کند:

خونریزی از دهان، لثه یا بینی، پوست نرم

آسیب به سیستم لنفاوی و رگ‌های خونی

خونریزی داخلی، که می‌تواند منجر به استفراغ سیاه و مدفوع

خونی شود

افت پلاکت

لکه‌های خونی کوچک در زیر پوست

نبض ضعیف

این بیماری با نام‌های دیگری همچون «تب دانگی» و «تب استخوان شکن» هم شناخته می‌شود و عامل انتشار آن **پشه آندسی** است. این بیماری معمولاً در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بیشتر دیده می‌شود.

بیماری دانگی خفیف، باعث تب شدید و علائم شبیه آنفولانزا می‌شود. ولی در موارد شدیدتر می‌تواند خطرناک باشد و زندگی فرد را تهدید کند.

روش انتقال تب دانگی

ویروس از پشه آلوده به انسان منتقل می‌شود.

یک پشه، فردی که به ویروس دانگی آلوده است را نیش می‌زند و به این ترتیب پشه آلوده به ویروس می‌شود و ویروس در بدن پشه تکثیر می‌شود و وقتی پشه شخص دیگری را نیش بزند، ویروس به نفر دوم منتقل می‌شود.

