



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سمنان
واحد آموزش و ارتقاء سلامت

عفونت خون در نوزاد



کد پمفلت: ATF 186/5/05.05

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵

تایید کننده علمی: خانم دکتر یلدا تقی پور

اگر علائم زیر را در کودک تا ۳ ماهگی مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید:

- ۱- کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- ۲- تب بالای ۳۸ درجه در نوزادان تازه متولد شده تا یک ماهگی و همچنین دمای بدن نوزاد کمتر از ۳۶,۵
- ۳- نفس کشیدن غیر عادی یا تند تند نفس کشیدن
- ۴- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- ۵- خواب آلودگی و بی حالی
- ۶- ورم یا برجستگی ملاج ها در نوزادان
- ۷- هرگونه تغییر حرکتی و رفتاری که موجب نگرانی شما است .

درمان نوزاد چگونه انجام می شود؟

- آنتی بیوتیک از طریق ورید
- مایعات و داروهای حمایتی
- اکسیژن و مراقبت تنفسی در صورت نیاز
- انجام آزمایش های لازم و پایش مداوم
- تغذیه از راه ورید یا لوله تا زمان بهبود

پس از ترخیص از NICU

- ✓ داروها را طبق دستور پزشک کامل مصرف کنید.
- ✓ بهداشت دست ها و محیط را رعایت کنید.
- ✓ از تماس با افراد بیمار خودداری کنید.
- ✓ تغذیه مناسب و ویزیت های پیگیری را فراموش نکنید.
- ✓ در صورت تب، بی حالی یا کاهش خوردن سریعاً به پزشک پزشک مراجعه کنید.

چه زمانی باید به پرستار یا پزشک اطلاع دهید؟

- اگر متوجه تغییر در وضعیت نوزاد شدید.
- اگر سوالی درباره داروها، تغذیه یا مراقبت ها دارید.
- اگر علائمی مانند تب، بی حالی، استفراغ یا مشکل در تنفس را مشاهده کردید.

منابع:

- Nelson Textbook of Pediatrics- 22nd Edition- 2024
 - Wong's Nursing Care of Infants and Children 12th Edition-2024
- جهت رویت پمفلت های بیشتر به سایت بیم ارستان
امیرالمومنین مراجعه کنید.
<https://amirhos.semums.ac.ir>

عفونت خون در نوزاد

عفونت خون وضعیتی است که در آن بدن با یک عفونت جدی روبرو می شود و این بیماری زمانی اتفاق می افتد که بدن نوزاد به یک عفونت واکنش شدید نشان بدهد و یک التهاب در کل بدن ایجاد می شود و میتواند به اندام های حیاتی نوزاد آسیب جدی بزند.

تشخیص و درمان

اگر نوزاد علائم بیماری را داشت باید آزمایش خون و آزمایش ادرار و عکس برداری از قفسه سینه انجام می شود.

در صورت عفونت خون در نوزاد باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری و درمان شود. آنتی بیوتیک های تزریقی از راه رگ برای نوزاد شروع شده و باید تا ۴۸ ساعت ادامه یابد.



معمولا با داشتن علائم و قبل از اینکه جواب آزمایش حاضر و تشخیص قطعی شود پزشک آنتی بیوتیک را شروع میکند، زیرا تا حاضر شدن جواب آزمایشات ۲-۳ روز زمان لازم است و منتظر ماندن برای جواب آزمایش می تواند باعث انتشار عفونت در کل بدن و بدحال تر شدن نوزاد و سخت شدن روند درمان شود.

مراقبت ها از نوزاد

شستشوی دستها قبل از تماس با نوزاد

عدم بوسیدن نوزاد

دوری از افراد دارای بیماریهای ویروسی و عفونی
مانند سرماخوردگی

عدم استعمال دخانیات در منزل

خلوت بودن و کاهش تردد در اتاقی که نوزاد
حضور دارد

دمای اتاق ۲۲-۲۴ درجه باشد

هفته ای ۲ بار حمام شود

ملحفه ها و لباسهای نوزاد در صورت آلودگی

تعویض و در صورت عدم آلودگی روزانه تعویض
شود.

تعویض پوشک حداکثر تا ۳ ساعت انجام گردد.

کنترل بند ناف از نظر ترشحات ناحیه، خشک و
تمیز بودن نگه داشته شود.

